



**SEA**

ESPONTÁNEA  
SEGURA  
CURIOSA  
RESILIENTE  
ALENTADORA  
**USTED MISMA**  
CREATIVA  
AVENTURERA  
**CON CABOMETYX A SU LADO**

No es un paciente real

## UN MANUAL DE CABOMETYX PARA PACIENTES Y SUS CUIDADORES



Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

## ÍNDICE

Qué se incluye en este manual.....	3
Qué es CABOMETYX.....	4
Cómo funciona CABOMETYX.....	4
Posibles efectos secundarios.....	5-8
Cómo manejar los efectos secundarios.....	9
Cómo tomar CABOMETYX .....	10-11
Asistencia financiera .....	12
Glosario.....	13
Preguntas para hacerle al <i>médico oncológico</i> .....	14

## ¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE MANUAL?

Este manual le ayudará a responder algunas de las preguntas que puede tener sobre su tratamiento con CABOMETYX.

Entre los temas cubiertos en el manual, se incluyen los siguientes:

- Qué es CABOMETYX y cómo funciona
- Cómo tomar CABOMETYX y por qué podría cambiar la dosis
- Información financiera y de apoyo

Tenga en cuenta que las palabras en *cursiva* están incluidas en el glosario de términos en la página 13.

Si desea obtener más información, visite:



[www.cabometryx.com](http://www.cabometryx.com)

**Si tiene alguna pregunta, hable con su enfermero o *médico oncológico*. Ellos son siempre su mejor recurso médico.**

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic **aquí** para la Información para pacientes o **aquí** para la Información completa de prescripción

**CABOMETYX**<sup>®</sup>  
(cabozantinib) tablets

# 1

## ¿QUÉ ES CABOMETRYX?

CABOMETRYX (que se pronuncia: ka-bo-ME-tiks) es:

- Una tableta
- Un medicamento recetado que se usa para tratar:
  - a personas con cáncer de riñón (carcinoma de células renales)
  - a personas con cáncer de hígado (carcinoma de células hepáticas) que fueron previamente tratadas con el medicamento sorafenib.

No se sabe si CABOMETRYX es seguro y efectivo en los niños.

# 2


## ¿CÓMO FUNCIONA CABOMETRYX?

Todas las células reciben señales que les indican cuándo crecer, dividirse, o morir. A diferencia de las células normales, las células cancerosas no dejan de crecer y dividirse cuando deberían.


Este crecimiento fuera de control puede causar que se formen *tumores*.

Se cree que CABOMETRYX funciona al bloquear algunas señales de “crecimiento/división”, que puede provocar la muerte celular. También se cree que ayuda a bloquear el crecimiento de vasos sanguíneos que alimentan a las células cancerosas. Cuando las células cancerosas mueren, es posible que los *tumores* dejen de crecer o incluso que se achiquen.

### CÉLULA CANCEROSA



### CÉLULA CANCEROSA



Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

# 3

## ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE CABOMETRYX?

### Es importante que conozca esta Información importante de seguridad

CABOMETRYX podría provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:



**Sangrado (hemorragia).** CABOMETRYX puede causar sangrado grave que podría provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguna señal de sangrado durante el tratamiento con CABOMETRYX, incluidas las siguientes:

- tos con sangre o coágulos de sangre
- vómito de sangre o vómito con forma de granos de café
- heces rojas o negras (como brea)
- sangrado menstrual más espeso de lo normal
- cualquier sangrado inusual o espeso



**Un desgarro en el estómago o en la pared intestinal (perforación) o una conexión anormal entre dos partes del cuerpo (fístula).** Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene sensibilidad o dolor en el área del estómago (abdomen).



**Coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques al corazón y dolor en el pecho.** Si experimenta alguno de los siguientes problemas, obtenga ayuda de emergencia de inmediato:

- hinchazón o dolor en los brazos o las piernas
- dificultad para respirar
- sensación de aturdimiento o desmayos
- más sudoración de lo normal
- adormecimiento o debilidad en el rostro, los brazos o las piernas, especialmente de un lado del cuerpo
- confusión repentina o dificultad para hablar o entender
- dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos
- dificultad repentina para caminar
- mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación
- fuerte dolor de cabeza repentino



## Información importante de seguridad (continuación)



**Presión arterial alta (hipertensión).** La hipertensión es común durante el tratamiento con CABOMETYX y, a veces, puede ser grave. Su proveedor de atención médica le controlará la presión arterial antes de comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el tratamiento con CABOMETYX. Si es necesario, también podría recetarle medicamentos para tratar la presión arterial alta.



**Diarrea.** La diarrea es común durante el tratamiento con CABOMETYX y puede ser grave. Si es necesario, su proveedor de atención médica podría recetarle medicamentos para tratar la diarrea. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si, con frecuencia, sus heces son blandas o líquidas.



**Un problema de la piel llamado reacción cutánea mano-pie.** Las reacciones cutáneas mano-pie son comunes y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene erupciones, enrojecimiento, dolor, hinchazón o ampollas en las palmas de las manos o las plantas de los pies.



**Proteína en la orina y posibles problemas renales.** Entre los síntomas podrían incluirse hinchazón en las manos, los brazos, las piernas o los pies.



**Problemas de mandíbula graves (osteonecrosis).** Entre los síntomas podrían incluirse dolor en la mandíbula, en los dientes, o malestar leve en las encías. Su proveedor de atención médica debería revisarle su boca antes de comenzar el tratamiento con CABOMETYX y durante el tratamiento con CABOMETYX. Informe a su dentista que está tomando CABOMETYX. Es importante que practique una buena higiene bucal durante el tratamiento con CABOMETYX.



**Problemas con la cicatrización de heridas.** Si debe someterse a una cirugía, infórmele a su proveedor de atención médica que está tomando CABOMETYX. Su proveedor de atención médica debe interrumpir su tratamiento con CABOMETYX al menos 28 días antes de cualquier cirugía programada, incluidos los procedimientos dentales invasivos. Su proveedor de atención médica le indicará cuándo puede comenzar a tomar CABOMETYX nuevamente luego de la cirugía.



**Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR).** Durante el tratamiento con CABOMETYX, puede desarrollarse una afección llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolores de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o problemas para pensar.



CABOMETYX podría provocar problemas de fertilidad en hombres y mujeres que podrían afectar sus posibilidades de concebir. Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca de la fertilidad.



**Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis de CABOMETYX, suspender su administración temporariamente o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted presenta determinados efectos secundarios.**

Entre los efectos secundarios más comunes de CABOMETYX se incluyen:

- Fatiga
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso
- Náuseas
- Vómitos
- Cambios en determinadas pruebas de sangre

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CABOMETYX.



**Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) al 1-800-FDA-1088.**



**Antes de tomar CABOMETYX, informe a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga, incluida cualquiera de las siguientes:**

- Tiene una historia de sangrado inusual reciente, como por ejemplo tos con sangre o vómitos con sangre, o heces negras (como brea).
- Tiene una herida abierta o en proceso de cicatrización.
- Tiene presión arterial alta.
- Planea realizarse una cirugía, incluida una cirugía dental. Debe interrumpir el tratamiento con CABOMETYX al menos 28 días antes de cualquier cirugía programada.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

## Información importante de seguridad (continuación)

- Está embarazada o planea quedar embarazada. CABOMETYX puede hacerle daño a su bebé.
  - Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica revisará si está embarazada antes de comenzar su tratamiento con CABOMETYX.
  - Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y 4 meses después de la dosis final de CABOMETYX.
  - Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.
  - Si queda embarazada o piensa que lo está, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si CABOMETYX pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni durante los 4 meses posteriores a la dosis final de CABOMETYX.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos herbales recetados o de venta libre. CABOMETYX y otros medicamentos determinados podrían afectarse mutuamente y provocar efectos secundarios.

## 4

## ¿PUEDEN MANEJARSE LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Se han observado efectos secundarios en las personas que tomaron CABOMETYX. Informe a su enfermero o *médico oncológico* de inmediato si experimenta algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece. Cuanto antes conozcan los efectos secundarios que tiene, antes podrán ayudarlo a manejarlos, si es posible.

**Podría ser necesario ajustar la dosis para manejar determinados efectos secundarios, por ejemplo:**



Diarrea



Fatiga (cansancio excesivo o sensación de que no tiene energía)



Aftas en la boca



Reacción cutánea mano-pie



Náuseas (ganas de vomitar) o vómitos



Hipertensión (presión arterial alta)

Si experimenta algún efecto secundario, expréselo de inmediato. Si experimenta determinados efectos secundarios, su médico podría tener que ajustar su dosis para encontrar la dosis de CABOMETYX más adecuada para usted.

**Obtenga más información acerca de ajustes de dosis en la página 11, “¿Cambiaré mi dosis?”**

Existen otras formas de ayudar a manejar determinados efectos secundarios, además de cambiar la dosis. Su enfermero o *médico oncológico* le recomendará cambios a su estilo de vida y otros medicamentos que pueden ayudar.



Si desea obtener más información, puede encontrar consejos para controlar determinados efectos secundarios en [www.cabometryx.com](http://www.cabometryx.com)



o en las tarjetas con consejos para el manejo de efectos secundarios que se encuentran en el kit de cuidados para pacientes.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

**CABOMETYX**<sup>®</sup>  
(cabozantinib) tablets

## 5 ¿CÓMO DEBE TOMAR CABOMETYX?

CABOMETYX es una tableta que se toma una vez al día.



**NO TOME  
CABOMETYX CON  
LA COMIDA**

**TOME CABOMETYX AL MENOS  
UNA HORA ANTES O AL MENOS  
2 HORAS DESPUÉS DE COMER**



**TÓMELA ENTERA  
CON 8 oz DE AGUA  
NO LA TRITURE**

El tamaño de las tabletas no es el real.



Durante el tratamiento con CABOMETYX, no tome jugo de pomelo (toronja), no coma pomelo y no ingiera suplementos que contengan pomelo ni hierbas de San Juan ("St. John's wort").

## 6 ¿QUÉ SUCEDE SI SE OLVIDA DE TOMAR CABOMETYX?

Si se olvida de tomar CABOMETYX y debe tomar la próxima dosis en:

### MENOS DE 12 HORAS

- No intente compensar la dosis olvidada
- Tome la siguiente dosis en el horario habitual

### 12 HORAS O MÁS

- Tome la dosis olvidada lo antes posible
- Tome la siguiente dosis en el horario habitual



**Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si toma demasiado CABOMETYX.**

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

## 7 ¿CAMBIARÁ SU DOSIS DE CABOMETYX?

Si experimenta determinados efectos secundarios, su enfermero o *médico oncológico* podrían ajustar su dosis. Ellos podrían:



Suspender CABOMETYX por un tiempo



Reducir la dosis de CABOMETYX

Suspender o reducir la dosis de CABOMETYX es común. Muchas personas en los *ensayos clínicos* de CABOMETYX tuvieron que suspender o reducir sus dosis para ayudar a manejar determinados efectos secundarios.

Algunas veces, según sus efectos secundarios, su médico podría interrumpir el tratamiento.

Asegúrese de tomar los medicamentos según las recomendaciones de su *médico oncológico*.

**CABOMETYX está disponible en 3 dosis diferentes.**



60 mg



40 mg



20 mg

El tamaño de las tabletas no es el real.

Cada persona que toma CABOMETYX responderá de manera diferente. Junto con su *médico oncólogo*, determinarán qué dosis es la adecuada para usted, según la forma en que su cuerpo responda a CABOMETYX.



## Acceso. Asistencia. En todo el camino.

Exelixis Access Services (EASE) es el recurso indicado si tiene preguntas y necesidades acerca de la cobertura, la asistencia financiera y el apoyo para los tratamientos con CABOMETYX.

**Para obtener más información sobre cómo EASE puede ayudarlo, comuníquese con nosotros:**



**Llame al: 1-844-900-EASE**  
(1-844-900-3273)



De lunes a viernes,  
de 8:00 A.M. a 8:00 P.M.,  
Hora del este

### APOYO PERSONALIZADO PARA USTED

Profesionales capacitados están disponibles por teléfono para ayudarlo con lo siguiente:

- Entender si su seguro médico cubre CABOMETYX y cuáles serán sus costos de bolsillo asociados con CABOMETYX
- Conocer sus opciones de asistencia financiera

#### Si tiene un seguro comercial...



#### Programa de copago de EASE

Los pacientes elegibles que tienen un seguro comercial pagan \$0 al mes por CABOMETYX. El programa cubre los costos de bolsillo restantes del medicamento, hasta un límite anual de \$25,000. Los pacientes que tienen un seguro gubernamental están excluidos. Se aplican restricciones y normas de elegibilidad adicionales.

#### Si no tiene seguro o si lo tiene, pero aun así no puede pagar el medicamento...



#### Programa de asistencia para pacientes de EASE

Si reúne los requisitos, puede recibir CABOMETYX sin costo. Se aplican restricciones y normas de elegibilidad adicionales.

Esta descripción del programa Exelixis Access Services® tiene solo fines informativos. Exelixis no hace declaraciones ni garantías con respecto al reembolso o la cobertura de un servicio o artículo. La información proporcionada mediante el programa de servicios de acceso de Exelixis no constituye asesoramiento médico ni legal, y no tiene el objetivo de sustituir una consulta con un proveedor de atención médica licenciado, un asesor legal o cualquier tercero pagador. Exelixis se reserva el derecho de modificar el programa en cualquier momento, sin aviso previo.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción**

## GLOSARIO

**Ensayo clínico:** Investigación diseñada para probar nuevos enfoques médicos, como medicamentos nuevos, y la forma en que funcionan en las personas.

**Médico oncológico:** Un médico que diagnostica y trata el cáncer. Esta persona es el punto de contacto principal para cualquier pregunta relacionada con CABOMETYX. Él/ella también podría coordinar el tratamiento recetado por otros especialistas.

**Tumor:** Una masa anormal de células que se desarrolla porque las células están creciendo y se están dividiendo más rápidamente de lo que deberían, y no mueren cuando deberían. Un tumor puede ser canceroso o benigno (no canceroso).





# OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN [WWW.CABOMETYX.COM](http://WWW.CABOMETYX.COM)

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este folleto y haga clic [aquí](#) para la Información para pacientes o [aquí](#) para la Información completa de prescripción

